

アセトアミノフェン含有製剤の使用上の 注意改訂のお知らせ

令和5年2月吉日
日新薬品工業株式会社

平素より弊社製品をご愛顧いただき、厚くお礼申し上げます。

このたび、アセトアミノフェン含有製剤の使用上の注意を改訂致しました。在庫等の関係上、改訂された表示内容の製品がお手元に届くまでには、時間がかかると予想されます。製品のご販売・ご使用に際しましては、改訂内容をご確認頂きますようお願い申し上げます。

記

【弊社お客様相談室】

電話：0120-415-688 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

1. 該当製品

薬効群	該当製品
かぜ薬	トピックスーパー
	かぜ薬 トピック GX
解熱鎮痛薬	セメジン顆粒

2. 改訂内容（下線部を改訂）

改訂前		改訂後	
<u>相談すること</u> 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 略 まれに下記の重篤な症状が起こる可能性があります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。		<u>相談すること</u> 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 現行通り まれに下記の重篤な症状が起こる可能性があります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。	
症状の名称	症状	症状の名称	症状
略	略	現行通り	現行通り
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤・赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。	皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤・赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

略	略	薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。
		肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
		現行通り	現行通り

以上